

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.2

名前

得点

/10

問1 南アメリカ大陸を流れるある河川は、赤道付近に位置し、世界最大の流域面積を持つ。この河川は豊かな流量を誇り、本流や主要な支流沿いに農産物や鉱産物の輸出港が点在し、河口から遠く離れた上流まで大型船舶の航行が可能である。この河川の名称を答えよ。 （2006年 全国公立入試 類似）

1. オリノコ川 2. パラナ川 3. ラプラタ川 4. アマゾン川

問2 陸地の周辺に広がる水深200m程度までの緩やかな傾斜を持つ平坦な海底地形で、東南アジアのマレー半島やカリマンタン島に囲まれた海域、あるいはメキシコ湾からユカタン半島周辺にかけて広く発達し、好漁場や海底資源の宝庫となっているものを何というか。 （2022年 全国公立入試 類似）

1. 大陸棚 2. 深海盆 3. 海底谷 4. 大陸麓

問3 赤道付近の低緯度地域に広く分布し、一年を通じて太陽放射の季節変化が極めて小さいため、気温の年較差が最小となる。年中高温多雨で、植生としては多種類の常緑広葉樹からなる密林が形成されるケッペンの気候区分における気候区は何か。 （2008年 全国公立入試 類似）

1. 温暖湿潤気候 2. 熱帯雨林気候 3. 地中海性気候 4. 西岸海洋性気候

問4 青森県八戸付近の海岸部において、馬淵川の河口付近に発達した砂州によって海が堰き止められて形成された、サロマ湖や八郎潟などと同様の成因を持つ湖沼を何というか。 （2007年 全国公立入試 類似）

1. 塩湖 2. 潟湖 3. 池沼 4. 礁湖

問5 ユーラシア大陸東岸の中緯度・高緯度地域は、同緯度の大陸西岸に比べて冬の寒さが非常に厳しく、気温の年較差が大きくなる。この気候特性をもたらす要因として、冬季にユーラシア大陸内部で著しく発達し、東岸地域へ冷たく乾燥した風を吹き出す高気圧の名称を何というか。 （2014年 全国公立入試 類似）

1. チベット高気圧 2. アソレス高気圧 3. シベリア高気圧 4. ブラジル高気圧

問6 地中海沿岸において、オリーブやブドウなどの果樹栽培に適した赤褐色の間帯土壌（テラロッサ）が形成される要因となった、風化前の基盤となる岩石は何か。 （2011年 全国公立入試 類似）

1. 凝灰岩 2. 角礫岩 3. 石灰岩 4. 苦灰岩

問7 鳥取県西部に位置する弓ヶ浜半島は、美保湾と汽水湖を分けるように発達した細長い地形景観を呈している。このように、沿岸流や波によって運ばれた砂礫が、湾の入り口を塞ぐように、あるいは島と陸地を繋ぐように細長く堆積して形成された地形を何というか。 （2009年 全国公立入試 類似）

1. 砂嘴 2. 潟湖 3. 砂州 4. 浜堤

問8 島根半島の東部から南東方向を望むと、弓状に細長く伸びる砂州の左右にそれぞれ異なる水域が広がっている様子が観察できる。この砂州の西側に位置し、大橋川を通じて宍道湖とも連結している、日本で5番目に大きい面積を持つ汽水湖の名称を答えよ。 （2009年 全国公立入試 類似）

1. 北浦 2. 潟沼 3. 西湖 4. 中海

問9 南半球の南太平洋西部で発生する熱帯低気圧は、発生後に高緯度側へと移動する。この熱帯低気圧が、赤道付近から南へ進み、さらに南東方向へと進路を変える際に影響を与える、地球の自転に伴って運動する物体に働く見かけの力を何というか。 （2023年 全国公立入試 類似）

1. 重力 2. フーコーの振り子 3. 遠心力 4. コリオリの力

問10 ユーラシアプレートとインドプレートの衝突によって形成されたヒマラヤ山脈を擁するネパールでは、標高の高い山岳地帯において、山岳氷河による鋭い侵食谷が刻まれた険しい地形が広がっている。このような、中生代以降のプレート運動によって形成され、現在も地殻変動が活発で険しい山脈が連なる地帯を何というか。 （2025年 全国公立入試 類似）

1. 大地溝帯 2. 新期造山帯 3. 火山列島 4. 古期造山帯