

- 問1 被子植物の双子葉類のうち、アブラナやサクラのように、花弁が1枚ずつ独立しており、根元でつながっていない特徴を持つ仲間の名称を何とい
いますか。 (2021年 秋田県公立入試 類似)
1. 合弁花類 2. 離弁花類 3. 単子葉類 4. 裸子植物
- 問2 ゼニゴケやスギゴケなどのコケ植物の体の下部には、細い糸状の構造が見られます。この構造の名称と、主な役割の組み合わせとして適切なも
のはどれですか。 (2017年 北海道公立入試 類似)
1. 主根といい、土の中から積極的に
水分を吸収する役割がある。 2. 仮根といい、体を地面や岩に固定
する役割がある。 3. ひげ根といい、体を固定しながら
効率よく養分を吸収する役割がある
。 4. 側根といい、光合成を行うために
必要な二酸化炭素を取り込む役割が
ある。
- 問3 両生類と爬虫類を比較したとき、両生類にのみ当てはまる特徴として正しいものはどれか。 (2021年 大分県公立入試 類似)
1. 周囲の温度の変化にともなって体
温が変化する。 2. 一生を通じて肺だけで呼吸を行う。 3. 体表が乾燥したうろこでおおわ
れている。 4. 成長の過程で、呼吸を行う場所が
えらから肺へと変化する。
- 問4 ゼニゴケは湿った場所に群生し、地面に密着した平坦な体のつくりをしている。このような体のつくりを持つ植物の水の吸収や輸送の仕組みに
ついて、正しく説明しているものはどれか。 (2023年 兵庫県公立入試 類似)
1. 道管と師管が発達しているため、
根から吸い上げた水分を体全体に効
率よく運んでいる。 2. 仮根（かこん）と呼ばれる組織が
道管の役割を果たし、土の中の水を
吸い上げている。 3. 発達した根によって地中の水分を
吸収し、茎を通して葉まで運んでい
る。 4. 維管束を持たないため、主に体の
表面全体から水分を直接吸収してい
る。
- 問5 双眼実体顕微鏡を用いて観察を行う際、両目の間隔を調節して左右の視野を一つに重ねた後、最初に行うべきピント合わせの操作として適切な
ものはどれか。 (2019年 長崎県公立入試 類似)
1. 右目だけでのぞき、微動ねじを回
してピントを合わせる 2. 左目だけでのぞき、視度調節リン
グを回してピントを合わせる 3. 両目でのぞきながら、視度調節リ
ングと微動ねじを同時に回す 4. 右目だけでのぞき、粗動ねじを回
してピントを合わせる
- 問6 被子植物のうち、発芽したときに最初に現れる子葉が1枚である植物のグループを何と呼ぶか、正しい名称を答えなさい。 (2024年 佐賀県公立入試 類似)
1. 離弁花類 2. 双子葉類 3. 単子葉類 4. 合弁花類
- 問7 被子植物の茎の断面において、道管と師管が集まった組織を維管束といいます。この維管束の並び方について、双子葉類に見られる特徴を説明
したものとして適切なものはどれですか。 (2022年 福島県公立入試 類似)
1. 維管束が茎の最も外側の表皮と一
体化している 2. 維管束という束を作らず、道管だ
けが中心に集まっている 3. 維管束が茎の断面全体にバラバラ
に散らばっている 4. 維管束が茎の断面に輪の形に並ん
でいる
- 問8 「植物が光合成を行うには光が必要である」という仮説を検証するために、対照実験を計画しました。以下の操作のうち、光の有無による影響
を純粹に調べるための方法として、最も適切なものはどれですか。 (2026年 栃木県公立入試 類似)
1. 同じ種類の植物を2つ用意し、一
方は光の当たる場所に、もう一方は
光の当たらない暗室に置き、それ以
外の温度や湿度などの条件はすべて
同じにする。 2. 同じ植物の葉の一部をアルミニウ
ムはくで覆い、肥料を与えた状態で
光の当たる場所に置き、肥料の効果
と光の効果をあわせて観察する。 3. 同じ種類の植物を2つ用意し、一
方は光の当たる暖かい場所に、もう
一方は光の当たらない冷たい場所に
置き、温度の影響も同時に調べる。 4. 種類の異なる植物を2つ用意し、
それぞれ光の当たる場所と当たらな
い場所に置いて、植物の種類による
違いがないかを確認する。
- 問9 種子をつくらない植物のうち、シダ植物がコケ植物と共通して持っている特徴と、シダ植物だけが持っている特徴の組み合わせとして正しいも
のはどれか。 (2021年 岡山県公立入試 類似)
1. 胞子で増える点は共通しており、
シダ植物だけが維管束を持ち、葉・
茎・根の区別がある。 2. 胞子で増える点は共通しており、
シダ植物だけが維管束を持たず、体
全体で水分を吸収する。 3. 種子で増えない点は共通しており
、シダ植物だけが維管束を持たず、
葉・茎・根の区別がない。 4. 日光で光合成を行う点は共通して
おり、シダ植物だけが種子をつくり
、維管束を持つ。
- 問10 土から抜いたネギの根を観察すると、中心の一点から数十本の細い根が房のように分かれて伸びている様子が確認できる。これと同じ根のつく
りを持つ植物を、次のうちから選びなさい。 (2016年 広島県公立入試 類似)
1. アブラナ 2. エンドウ 3. タンポポ 4. トウモロコシ
- 問11 植物の茎を赤いインクを溶かした水に数時間つけてから茎を横に切り、その断面を観察しました。このとき、赤く染まって見える管の名称と、
その管が主に運んでいるものの組み合わせとして適切なものを選びなさい。 (2017年 北海道公立入試 類似)
1. 道管：葉で作られた養分 2. 師管：葉で作られた養分 3. 師管：根から吸収された水や肥料分 4. 道管：根から吸収された水や肥料分
- 問12 被子植物の花において、受粉が行われた後に「子房」と「胚珠」はそれぞれどのように変化しますか。その組み合わせとして適切なものを選び
なさい。 (2018年 北海道公立入試 類似)
1. 子房は胚に、胚珠は胚乳になる 2. 子房は種子に、胚珠は果実になる 3. 子房は果実に、胚珠は種子になる 4. 子房はがくに、胚珠は花弁になる
- 問13 顕微鏡を用いてプレパラートを観察する際、対物レンズを低倍率から高倍率に切り替えたときに起こる変化として、最も適切なものはどれで
すか。 (2022年 奈良県公立入試 類似)
1. 対物レンズの先端とプレパラート
との距離が短くなる 2. 視野が明るくなり、観察できる範
囲が広がる 3. 対物レンズの先端とプレパラート
との距離は変化しない 4. 対物レンズの先端とプレパラート
との距離が長くなる
- 問14 カエルの成長過程における呼吸器官の変化について、水中で生活する幼生（オタマジャクシ）の時期と、陸上で生活する成体になったときの呼
吸方法の組み合わせとして、最も適切なものはどれですか。 (2021年 富山県公立入試 類似)
1. 幼生：皮膚呼吸 /
成体：えら呼吸のみ 2. 幼生：えら呼吸 /
成体：肺呼吸と皮膚呼吸 3. 幼生：肺呼吸 /
成体：えら呼吸と皮膚呼吸 4. 幼生：えら呼吸 /
成体：肺呼吸のみ