

答え合わせ・解説

問1	答え 2 外とう膜	イカやアサリなどの軟体動物は、内臓が「外とう膜」と呼ばれる筋肉質の膜に包まれているのが大きな特徴である。これらは節足動物のような硬い外骨格や体の節（ふし）を持たないため、分類上区別される。
問2	答え 2 植物Aは双子葉類でサクラが該当し、植物Bは単子葉類でユリが該当する。	中心となる太い根（主根）とそこから細く伸びる根（側根）をもつ植物Aは双子葉類であり、サクラやタンポポが該当します。ほぼ同じ太さの根が多数生えている（ひげ根）植物Bは単子葉類であり、ユリが該当します。
問3	答え 1 子葉の中に蓄えられていた養分が成長のために使われたため、子葉はしぼんで質量が減少する。	植物の種子にある子葉には、発芽とその後の初期成長に必要なデンプンなどの養分が蓄えられています。発芽して本葉が広がるまでの間、植物はこの養分を消費して成長するため、子葉は次第にしぼんでいき、それに伴って子葉部分の質量は減少します。
問4	答え 1 外とう膜と呼ばれ、内臓を保護するほか、貝殻をつくる成分を出す役割がある。	アサリなどの軟体動物の内臓を包んでいる膜は外とう膜です。この膜は内臓を保護するだけでなく、貝殻を持つ種類においては、その貝殻を形成する成分を分泌するという重要な役割も担っています。このつくりはアサリだけでなく、イカなど他の軟体動物にも共通して見られる特徴です。
問5	答え 2 恒温動物	周囲の環境温度が変化しても、エネルギーを消費して体温を一定の範囲に保つ仕組みを持つ動物を恒温動物と呼びます。鳥類や哺乳類がこれに該当し、寒い場所でも活発に活動できる利点があります。
問6	答え 3 対物レンズとプレパラートを横から見ながら近づけ、次に接眼レンズをのぞきながら遠ざけてピントを合わせる。	顕微鏡の操作では、まず対物レンズとプレパラートの距離を横から見て確認しながら、調節ねじで限界まで近づけます。その後、接眼レンズをのぞきながらレンズを遠ざける方向に動かしてピントを合わせるのが正しい手順です。これにより、レンズとプレパラートが接触して破損する事故を防ぐことができます。
問7	答え 4 アサリ、マイマイ、タコ	アサリ（二枚貝の仲間）、マイマイ（腹足類の仲間）、タコ（頭足類の仲間）は、いずれも外套膜を持ち、節のない足を持つ軟体動物です。バツタなどは節足動物、ミミズなどは環形動物、イモリなどはセキツイ動物に分類されるため、これらは軟体動物には含まれません。
問8	答え 1 仮根は植物体を地面に固定する役割をもち、水分は体全体で吸収する。	コケ植物の仮根は、種子植物の根とは異なり、水分を吸収するための維管束が通っていません。そのため、仮根の主な役割は植物体を地面や岩に「固定」することに限定されており、生存に必要な水分は体の表面全体から取り入れています。
問9	答え 2 葉脈が平行脈であり、根がひげ根である	単子葉類は、種子の中の子葉が1枚であることに加え、葉の脈が平行に通る「平行脈」であること、そして根が「ひげ根」であることがセットの特徴として現れます。一方、双子葉類は網目脈と主根・側根の組み合わせを持ちます。
問10	答え 3 道管と呼ばれ、根から葉に向かって上向きに運ばれる。	植物が根から吸収した水や水に溶けた肥料分は、道管という管を通して植物全体に運ばれます。この輸送は根から吸い上げられた水が葉へと向かうため、常に下から上への上向きの移動となります。一方、葉で作られた養分を運ぶ管は師管と呼ばれ、道管とは役割が異なります。
問11	答え 3 肺が未発達であり肺呼吸だけでは酸素が不足するため、皮膚を粘液などで湿った状態に保つ必要がある。	両生類の親は肺で空気中の酸素を取り込みますが、その肺は構造が単純で効率が悪いため、必要な酸素のすべてを肺だけでまかなうことができません。そのため、皮膚を通してガス交換を行う皮膚呼吸が不可欠です。皮膚呼吸を行うためには、皮膚が湿っている必要があるため、両生類は粘液で体を湿らせたり、水辺などの湿り気の多い場所に生息したりしています。昆虫に見られる「気門」による呼吸とは仕組みが異なります。
問12	答え 3 水中で生活する幼生はえらで呼吸し、陸上でも生活する成体は肺と皮膚で呼吸する。	両生類は成長の過程で生活場所が変化します。水中で生活する幼生（オタマジャクシ）は、水に溶けた酸素を取り入れるためにえらを用いていますが、成体になると陸上での生活に適応するため、空気中の酸素を取り入れる肺と、それを補助する皮膚を用いて呼吸を行うようになります。
問13	答え 3 気孔は、その両脇にある一対の孔辺細胞が形を変化させることによって、隙間の大きさが調節される	気孔は2つの孔辺細胞に囲まれて形成されている。孔辺細胞が水分を含んで膨らんだり、水分を失って収縮したりすることで気孔の隙間の大きさが変化し、蒸散量や気体の出入りがコントロールされている。