

問1	震央から等しい距離にある観測地点において、2つの地震AとBを観測したところ、地震Aの初期微動継続時間は地震Bの初期微動継続時間よりも長いことがわかりました。このとき、地震Aと地震Bの震源の深さの関係について述べたものとして、最も適切なものはどれですか。 （2025年 北海道公立入試 類似）			
	1. 震源の深さは、初期微動継続時間の長さには一切影響を与えない	2. 地震Bの震源の方が、地震Aの震源よりも深い	3. 地震Aの震源の方が、地震Bの震源よりも深い	4. 地震Aと地震Bの震源の深さは、全く同じである
問2	特定の地質年代にのみ生存していた生物の化石は、その地層が堆積した年代を特定する手がかりとなります。このような化石を何と呼びますか。 （2017年 群馬県公立入試 類似）			
	1. 示準化石	2. 保存化石	3. 示相化石	4. 生活痕化石
問3	地震が発生した地下の場所を震源といいますが、その震源の真上にある地表の地点を何といいますか。 （2019年 福井県公立入試 類似）			
	1. マグニチュード	2. 震央	3. 震度分布	4. 震源断層
問4	日本の代表的な火山である伊豆大島三原山、桜島、雲仙普賢岳について、マグマのねばりけが「弱い順」から「強い順」に正しく並んでいるものはどれですか。 （2016年 鹿児島県公立入試 類似）			
	1. 伊豆大島三原山 → 桜島 → 雲仙普賢岳	2. 雲仙普賢岳 → 桜島 → 伊豆大島三原山	3. 桜島 → 伊豆大島三原山 → 雲仙普賢岳	4. 伊豆大島三原山 → 雲仙普賢岳 → 桜島
問5	日本列島の東側に位置する広大な海洋プレートで、日本海溝付近から陸側のプレートの下に向かって斜め下向きに沈み込んでいるプレートの名前を答えなさい。 （2021年 埼玉県公立入試 類似）			
	1. フィリピン海プレート	2. 北アメリカプレート	3. 太平洋プレート	4. ユーラシアプレート
問6	生物の死骸などが固まってできた堆積岩のうち、薄い塩酸を加えると激しく発泡して二酸化炭素が発生する岩石の名称として最も適切なものを、次のうちから1つ選びなさい。 （2025年 熊本県公立入試 類似）			
	1. 凝灰岩	2. 砂岩	3. 石灰岩	4. チャート
問7	月の海などを構成する火山岩の一種である玄武岩を顕微鏡で観察すると、微細な結晶やガラス質でできた「石基」の中に、比較的大きな結晶である「斑晶」が点在している様子が見られます。このような火山岩特有の組織を何といいますか。 （2023年 大分県公立入試 類似）			
	1. 斑状組織	2. しゅう曲構造	3. 層理	4. 等粒状組織
問8	海溝付近において、海洋プレートが大陸プレートを斜め下方向に引き込み、大陸プレートが上方向に急激に動くことで地震が発生する現象について、その過程を正しく説明しているものはどれですか。 （2019年 佐賀県公立入試 類似）			
	1. プレートどうしが離れていく力によって、大陸プレートの先端が沈み込み、海底に深い溝ができる過程。	2. 大陸プレートの内部で断層が横方向にずれ、プレートの沈み込みを止めることでエネルギーが放出される過程。	3. 海洋プレートの沈み込みによって大陸プレートが圧縮され、上部に火山が形成されることで地殻が振動する過程。	4. 海洋プレートが沈み込む際に大陸プレートの端を巻き込み、元に戻ろうとするエネルギーが限界を超えて解放される過程。
問9	堆積岩は、泥岩・砂岩・れき岩のように「流水によって運ばれた粒の大きさ」で分類されるグループと、石灰岩・チャートのように「成分やでき方」で分類されるグループに分けられます。石灰岩の分類上の特徴について述べた次の説明のうち、最も適切なものはどれですか。 （2019年 群馬県公立入試 類似）			
	1. 生物の死がいからできていて、非常に硬く、鋼鉄の針でこすっても傷がつかない。	2. 生物の死がいや海水中の成分が堆積してできており、塩酸との反応によって判別できる。	3. 粒の大きさに関わらず、流水によって運ばれる過程で角が取れた粒からできている。	4. 火山灰が堆積してできたものであり、特有の鉱物を含んでいることで判別できる。
問10	火成岩の分類における「玄武岩」と「せん緑岩」の性質の違いを説明した文として、適切なものはどれですか。 （2018年 三重県公立入試 類似）			
	1. 玄武岩は有色鉱物の割合が多く、せん緑岩は玄武岩よりも有色鉱物の割合が少ない中程度である。	2. 玄武岩とせん緑岩は、どちらもマグマが地表付近で急激に冷え固まってできた岩石である。	3. 玄武岩は有色鉱物の割合が非常に少なく、せん緑岩は有色鉱物の割合が非常に多い。	4. 玄武岩は等粒状組織を持ち、せん緑岩は斑状組織を持っている。
問11	震源からの距離が120kmの観測地点において、地震波が到着するまでの時間を計算します。P波の伝わる速さを毎秒6kmとしたとき、地震が発生してからこの観測地点にP波が到着するまでにかかる時間は何秒ですか。 （2023年 福井県公立入試 類似）			
	1. 20秒	2. 720秒	3. 114秒	4. 0.05秒
問12	地震が発生したとき、最初に到達するP波による小さな揺れが始まってから、後から到達するS波による大きな揺れが始まるまでの時間を何といいますか。その名称として適切なものを選びなさい。 （2026年 三重県公立入試 類似）			
	1. 主要動継続時間	2. 初期微動継続時間	3. マグニチュード	4. 震度階級
問13	震源からの距離が28kmの地点で、P波が到着してからS波が到着するまでの時間（初期微動継続時間）が4秒であったとします。同じ地震において、震源からの距離が112kmの地点における初期微動継続時間は何秒になると考えられますか。ただし、岩盤の性質は均一で、波の伝わる速さは一定であるものとします。 （2022年 高知県公立入試 類似）			
	1. 12秒	2. 16秒	3. 8秒	4. 4秒
問14	マグマが地表や地表付近で急激に冷えて固まってできた火山岩に見られる、細かい粒の集まりの中に比較的大きな結晶が散らばっている組織を何といいますか。 （2016年 兵庫県公立入試 類似）			
	1. 層理	2. 斑状組織	3. ヘキ開	4. 等粒状組織
問15	ある地域において、離れた地点の地層を比較する際に指標となる火山灰の層のように、広い範囲に短期間で降り積もり、堆積した年代を特定する手がかりとなる層を何と呼びますか。 （2022年 静岡県公立入試 類似）			
	1. 示準化石の層	2. 鍵層	3. 不整合面	4. 露頭