

- 問1 加熱前の炭酸水素ナトリウムと、加熱後に得られた炭酸ナトリウムをそれぞれ水に溶かし、フェノールフタレイン溶液を加えたときの変化と性質について正しく述べたものはどれですか。なお、pH（ピーエイチ）の値についても考慮して答えなさい。（2021年 東京都公立入試 類似）
1. 炭酸ナトリウムの水溶液は、炭酸水素ナトリウムの水溶液と同じく薄い赤色になり、どちらも弱いアルカリ性を示す。

2. 炭酸ナトリウムの水溶液は中性を示すため無色であり、炭酸水素ナトリウムの水溶液よりもpHの値が小さい。

3. 炭酸ナトリウムの水溶液の方が、炭酸水素ナトリウムの水溶液よりも濃い赤色になり、より強いアルカリ性を示す。

4. 炭酸ナトリウムの水溶液の方が、炭酸水素ナトリウムの水溶液よりも薄い赤色になり、より弱いアルカリ性を示す。
- 問2 うすい塩酸と石灰石を反応させる実験において、石灰石を増やしていくとある時点で気体の発生量が一定になります。このように、加えた物質の質量を増やしても、得られる生成物の質量が増加しなくなる理由として最も適切な説明はどれですか。（2024年 愛媛県公立入試 類似）
1. 石灰石を増やすと水溶液の温度が急激に下がり、反応が止まるため

2. 発生した二酸化炭素が水溶液にすべて溶けてしまったため

3. 反応するもう一方の物質である塩酸がすべて反応し、なくなったため

4. 石灰石の密度が二酸化炭素よりも大きいため
- 問3 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱したとき、分解されて生じる白色の固体の名称と、その物質が水に溶けたときの性質の組み合わせとして正しいものはどれか。（2014年 長野県公立入試 類似）
1. 酸化ナトリウムであり、元の物質よりも強いアルカリ性を示す。

2. 炭酸ナトリウムであり、元の物質よりも強いアルカリ性を示す。

3. 酸化ナトリウムであり、元の物質よりも強い酸性を示す。

4. 炭酸ナトリウムであり、元の物質よりも弱いアルカリ性を示す。
- 問4 100gの水に対して、ある物質の溶解度が20℃で35.8g、80℃で38.0gであるとして、この物質を80℃の水に溶かして飽和水溶液を作りました。ここから冷却によって結晶を取り出そうとする際、期待される結果とその理由として正しいものを選びなさい。（2019年 群馬県公立入試 類似）
1. 温度が下がると溶解度が急激に下がるため、非常に多くの結晶が得られる。

2. 溶解度の値そのものが大きいため、冷却しても結晶は一切現れない。

3. 温度による溶解度の差が小さいため、冷却しても得られる結晶はわずかなのである。

4. 冷却すると溶解度が大きくなる性質があるため、結晶は得られない。
- 問5 スチールウール（鉄）をステンレス皿にのせ、十分な酸素がある状態で加熱して完全に反応させたところ、黒色の物質に変化しました。この実験における、反応後の物質の質量および性質の変化について説明したものとして正しいものを選びなさい。（2015年 岐阜県公立入試 類似）
1. 鉄に酸素が結びついたため全体の質量は増加し、金属特有の性質は失われた

2. 鉄から不純物を取り除かれたため全体の質量は減少し、金属特有の性質が強まった

3. 鉄に酸素が結びついたため全体の質量は増加したが、金属特有の性質は保たれた

4. 鉄が酸素と反応して気体が発生したため全体の質量は減少し、金属特有の性質は失われた
- 問6 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱したときに起こる化学変化を、化学反応式で正しく表したものはどれですか。（2017年 埼玉県公立入試 類似）
1. $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

2. $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{NaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

3. $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}$

4. $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- 問7 水の電気分解を行った際、陰極に発生する気体の分子と陽極に発生する気体の分子の個数比（水素分子：酸素分子）として、最も適切なものはどれですか。（2016年 群馬県公立入試 類似）
1. 2：3

2. 1：2

3. 1：1

4. 2：1
- 問8 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を水上置換法によって採集する実験を行います。このとき、加熱を開始して最初に出てきた気体は採集せずに捨て、しばらく経ってから気体を試験管に集めるのが適切です。その理由として最も正しい説明を選びなさい。（2026年 福岡県公立入試 類似）
1. 試験管やガラス管の中に最初からあった空気が混ざっており、発生した気体本来の性質を調べることができないから。

2. 炭酸水素ナトリウムが分解される前に、付着していた不純物が気体となって先に出てくるから。

3. 最初に発生する気体は反応が不安定であり、試験管に集めると破裂する危険があるから。

4. 加熱し始めの気体は温度が低いため、水に溶けやすく採集効率が悪くなるから。
- 問9 試験管に入れた物質をガスバーナーで加熱し、発生した気体を水上置換法で集める実験において、加熱をやめる際に行う操作として最も適切なものはどれですか。（2019年 山口県公立入試 類似）
1. ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管の先を水槽の水の中から出す。

2. ガラス管を水槽に入れたまま、ガスバーナーの空気調節ねじを閉めて火を消す。

3. 試験管が十分に冷えるのを待ってから、ガラス管を水槽の水の中から出す。

4. ガスバーナーの火を消した直後に、すみやかにガラス管を水槽の水の中から出す。
- 問10 同じ元素の原子であっても、原子核の中に含まれる陽子の数は同じで、中性子の数が異なるために質量が異なる原子がいくつか存在することがあります。このような関係にある原子同士を何と呼びますか。最も適切な名称を答えなさい。（2026年 広島県公立入試 類似）
1. 混合物

2. 化合物

3. 同素体

4. 同位体（アイソトープ）
- 問11 使い捨てカイロのように、物質が化学変化を起こすときに周囲に熱を放出し、温度が上昇する反応を何といいますか。その名称として適切なものを選びなさい。（2021年 宮城県公立入試 類似）
1. 中和反応

2. 還元反応

3. 吸熱反応

4. 発熱反応
- 問12 マグネシウムを空気中で加熱した際、酸素と結びついて生じる白色の物質の名称と化学式の組み合わせとして適切なものはどれですか。（2019年 滋賀県公立入試 類似）
1. 酸化マグネシウム、化学式は MgO

2. 酸化マグネシウム、化学式は $\text{Mg}(\text{OH})_2$

3. 二酸化マグネシウム、化学式は MgO_2

4. 酸化マグネシウム、化学式は Mg_2O
- 問13 水を電気分解すると、水素分子と酸素分子が2：1の体積比（個数比）で発生します。この実験において、発生した酸素分子全体の質量が、水素分子全体の質量の8倍であったことがわかっています。また、水素分子は2個の水素原子、酸素分子は2個の酸素原子が結びついてできています。これらの事実から導き出される、水素原子1個と酸素原子1個の質量比として正しいものはどれですか。（2019年 埼玉県公立入試 類似）
1. 水素原子：酸素原子 = 1：4

2. 水素原子：酸素原子 = 2：1

3. 水素原子：酸素原子 = 1：16

4. 水素原子：酸素原子 = 1：8