

- 問1 水のみを入れた飼育容器でカエルの幼生を育てていたところ、成長に伴って、水場だけでなく砂や小石による陸地を設けた環境に変更しました。このように飼育環境を変化させる必要がある理由として、成体の呼吸の仕組みに着目した説明として正しいものはどれですか。 (2021年 富山県公立入試 類似)
1. 成体になると肺呼吸を始めるため、水面から顔を出して空気中の酸素を取り入れる必要があるから
 2. 水の中では肺に水が入ってしまい、えらによる呼吸ができなくなるから
 3. 成体になるとえら呼吸を続けるために、常に皮膚を乾燥させておく必要があるから
 4. 陸上上がることで、肺呼吸を止めて皮膚呼吸のみに切り替える必要があるから
- 問2 手元に、10倍と15倍の2種類の接眼レンズ、および4倍、10倍、40倍の3種類の対物レンズがある。これらを自由に組み合わせて顕微鏡で観察を行うとき、総合倍率を400倍にするための正しい組み合わせはどれか。 (2025年 和歌山県公立入試 類似)
1. 10倍の接眼レンズと40倍の対物レンズ
 2. 10倍の接眼レンズと10倍の対物レンズ
 3. 15倍の接眼レンズと40倍の対物レンズ
 4. 15倍の接眼レンズと10倍の対物レンズ
- 問3 草食動物の消化管が、体格の近い肉食動物の消化管と比べて長くなっている理由として、最も適切なものはどれですか。 (2023年 山口県公立入試 類似)
1. 植物は肉に比べて栄養価が非常に高く、吸収する場所を多く確保するため
 2. 食べた植物が消化管の中で膨らみ、通りがふさがるのを防ぐため
 3. 植物の成分は分解されにくく、消化や吸収に時間がかかるため
 4. 一度に大量の植物を摂取し、胃の中に長時間保存しておく必要があるため
- 問4 顕微鏡の操作において、対物レンズをプレパラートに近づける際は、必ず真横からレンズとプレパラートの距離を目視しながら行わなければなりません。その理由として最も適切なものはどれですか。 (2020年 三重県公立入試 類似)
1. 対物レンズとプレパラートが接触して、レンズや資料が破損するのを防ぐため。
 2. 対物レンズを近づけすぎると、しぼりによる明るさの調節ができなくなるため。
 3. 真横から見ることで、対物レンズの倍率が正しいかどうかを確認するため。
 4. 接眼レンズから入る光が、対物レンズに反射して目を傷めるのを防ぐため。
- 問5 双眼実体顕微鏡でピントを合わせる際、右目のピントを粗動ネジで合わせた後、左目のピントを合わせるために「視度調節リング」以外の部分（粗動ネジなど）を動かしてはいけない理由として、適切な説明はどれですか。 (2021年 高知県公立入試 類似)
1. 左目のピントは鏡筒の上下ではなく、接眼レンズのレンズ間隔のみで決まるから。
 2. 粗動ネジを動かすと、せっかく合わせた右目のピントが再びずれてしまうから。
 3. 粗動ネジは倍率を変えるためのものであり、左目の微調整には使えないから。
 4. 視度調節リングを回すと鏡筒全体が上下し、右目のピントも自動的に追従するから。
- 問6 ゼニゴケやスギゴケなどのコケ植物の体の下部には、細い糸状の構造が見られます。この構造の名称と、主な役割の組み合わせとして適切なものはどれですか。 (2017年 北海道公立入試 類似)
1. 仮根といい、体を地面や岩に固定する役割がある。
 2. 主根といい、土の中から積極的に水分を吸収する役割がある。
 3. 側根といい、光合成を行うために必要な二酸化炭素を取り込む役割がある。
 4. ひげ根といい、体を固定しながら効率よく養分を吸収する役割がある。
- 問7 草食動物の歯のつくりを肉食動物と比較したとき、草食動物において臼歯が横に広く、表面が平らな形に発達している理由として最も適切な説明はどれですか。 (2024年 京都府公立入試 類似)
1. 地面の下にある植物の根を、土と一緒に掘り起こしやすくするため
 2. とらえた獲物が逃げないように、牙として深く突き刺すため
 3. 硬い植物の繊維を、石臼のようにすりつぶして消化しやすくするため
 4. 獲物の肉を骨から効率よく引きはがし、飲み込みやすくするため
- 問8 セイヨウタンポポの個別の花を詳しく観察したときの様子について、花弁の構造に着目した説明として最も適切なものはどれですか。 (2022年 大分県公立入試 類似)
1. 5枚の花弁がそれぞれ独立しており、1枚ずつ離れている
 2. 花弁が退化して存在せず、がくが花弁のような役割を果たしている
 3. 1枚の大きな花弁が複雑に折りたたまれて重なっている
 4. 5枚の花弁が根元から先端近くまで筒状に結合している
- 問9 脊椎動物の中で、体の表面が鱗（うろこ）でおおわれている動物の組み合わせとして最も適切なものはどれですか。 (2024年 石川県公立入試 類似)
1. 魚類のメダカと、両生類のカエル
 2. 爬虫類のワニと、両生類のサンショウウオ
 3. 両生類のカエルと、両生類のサンショウウオ
 4. 魚類のメダカと、爬虫類のワニ
- 問10 水を含ませた脱脂綿をしいた2つの容器にそれぞれ種子を入れ、ともに28℃の室内で観察しました。一方の容器には光を当て、もう一方の容器はアルミホイルで覆って光を遮断したところ、どちらの容器でも種子が発芽しました。この結果から確かめられることとして、最も適切なものはどれですか。 (2025年 熊本県公立入試 類似)
1. 種子は暗い場所では発芽できない。
 2. 種子の発芽には光と適当な温度の両方が必要である。
 3. 種子の発芽には土と光が必要である。
 4. 種子の発芽に光の有無は影響しない。
- 問11 魚類の心臓のつくりについて、その構造を正しく説明したものを選びなさい。 (2024年 福島県公立入試 類似)
1. 2つの心房と1つの心室からなる
 2. 1つの心房と2つの心室からなる
 3. 2つの心房と2つの心室からなる
 4. 1つの心房と1つの心室からなる
- 問12 インゲンマメの種子が発芽する前の状態と、発芽して本葉が十分に広がった後の状態を比較したとき、子葉に含まれる養分と質量の変化について説明したものとして正しいものはどれですか。 (2018年 兵庫県公立入試 類似)
1. 発芽後は光合成が始まるため、子葉の養分は使われなくなり、質量は発芽前と変わらない。
 2. 発芽に伴って子葉の養分が茎や根の成長に利用されるため、子葉の養分は減り、質量は減少する。
 3. 発芽に伴って子葉が光合成を行うようになるため、子葉自体の養分は増え続け、質量は増加する。
 4. 発芽後は根から吸収した肥料分が子葉に蓄えられるため、子葉の養分が増え、質量は増加する。
- 問13 植物の蒸散に関する実験において、水を入れたメスシリンダーに植物の枝をさし、水面に油を浮かべた装置を準備しました。この装置において、一定時間で減少した水の量（吸水量）と、植物から放出された水蒸気の量（蒸散量）の関係についての説明として、最も適切なものを選びなさい。 (2023年 三重県公立入試 類似)
1. 油をたらずことで蒸散そのものが抑制されるため、減少した水の量は実際の蒸散量よりも常に小さくなる。
 2. 植物が吸い上げた水のほとんどは蒸散によって体外へ放出されるため、減少した水の量を蒸散量とみなすことができる。
 3. 減少した水の量は、水面からの蒸発量と植物の蒸散量を合計した値を示している。
 4. 植物は吸い上げた水の半分を光合成の原料として消費するため、減少した水の量の半分が蒸散量となる。