

- 問1 銅原子1個、酸素原子1個、水素原子1個のそれぞれの質量を比較したとき、その質量比（銅原子：酸素原子：水素原子）として最も適切なものはどれですか。 （2019年 埼玉県公立入試 類似）
1. 4 : 1 : 1                      2. 64 : 16 : 1                      3. 64 : 8 : 1                      4. 4 : 1 : 16
- 問2 化学変化が起こるときに、周囲へ熱を放出し、その結果として物質や周囲の温度が上昇する反応を何といいますか。 （2016年 広島県公立入試 類似）
1. 吸熱反応                      2. 中和反応                      3. 還元反応                      4. 発熱反応
- 問3 三脚と三角架の上に置いたステンレス皿にマグネシウムの粉末を入れ、ガスバーナーで加熱して酸化させる実験を行う際、マグネシウムと酸素を十分に反応させるための操作として、最も適切なものはどれか。 （2021年 愛知県公立入試 類似）
1. 粉末を水で湿らせて、加熱した際の飛び散りを防ぐようにする                      2. 粉末を皿の底全体に薄く広げて、酸素に触れる表面積を大きくする                      3. 皿に密閉したふたをして、酸素が逃げないように閉じ込めて加熱する                      4. 粉末を皿の中央に高く積み上げて、内部の温度が上がりやすくする
- 問4 ある質量の酸化銅に対して、混合する炭素粉末の質量を0.10gから少しずつ増やして反応させる実験を行いました。炭素の質量を増やすほど反応後に残る固体の合計質量は減少していき、炭素の質量が0.30gになったときに固体の質量は最小値を示しました。炭素が0.30gのときに固体の質量が最小となった理由として、最も適切なものはどれかを選びなさい。 （2024年 石川県公立入試 類似）
1. 炭素の質量が0.30gに達するまでは、炭素が酸素と結びついて重い固体の二酸化炭素に変化し、それ以上では炭素が昇華して消えるため。                      2. 0.30gの炭素を加えたとき、酸化銅が還元されてできた銅と、反応に使われなかった炭素の質量の合計が、もとの酸化銅の質量と等しくなったため。                      3. 0.30gの炭素を加えたとき、酸化銅に含まれていたすべての酸素が炭素と過不足なく反応して二酸化炭素として放出され、固体が純粋な銅のみになったため。                      4. 0.30gの炭素を加えたとき、試験管内の酸化銅がすべて熱分解して酸素を放出し、さらに炭素がすべて燃焼して消失したため。
- 問5 炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体を石灰水に通す実験において、加熱を終える際、ガスバーナーの火を消す前に行うべき操作として最も適切なものはどれか。 （2017年 岡山県公立入試 類似）
1. 石灰水の入った試験管にふたをして、気体が逃げないようにする。                      2. ガラス管の先を石灰水の中から外に出す。                      3. ガスバーナーの空気調節ねじを先に締める。                      4. 試験管の口をゴム栓で密閉する。
- 問6 水の有無を調べるために用いられる試験紙の名称と、水に触れたときの色の変化の組み合わせとして正しいものはどれですか。 （2018年 福島県公立入試 類似）
1. 塩化コバルト紙を用い、赤色から青色に変化する                      2. リトマス紙を用い、赤色から青色に変化する                      3. 塩化コバルト紙を用い、青色から赤色に変化する                      4. リトマス紙を用い、青色から赤色に変化する
- 問7 酸化銅と炭素の粉末を混ぜ合わせて加熱したとき、酸化銅は酸素を奪われて銅に変化します。このように、酸化物から酸素が取り除かれる化学変化を何といいますか。 （2020年 北海道公立入試 類似）
1. 中和                      2. 分解                      3. 還元                      4. 酸化
- 問8 水を電気分解すると、水素分子と酸素分子が2 : 1の体積比（個数比）で発生します。この実験において、発生した酸素分子全体の質量が、水素分子全体の質量の8倍であったことがわかっています。また、水素分子は2個の水素原子、酸素分子は2個の酸素原子が結びついてできています。これらの事実から導き出される、水素原子1個と酸素原子1個の質量比として正しいものはどれですか。 （2019年 埼玉県公立入試 類似）
1. 水素原子 : 酸素原子 = 1 : 8                      2. 水素原子 : 酸素原子 = 2 : 1                      3. 水素原子 : 酸素原子 = 1 : 4                      4. 水素原子 : 酸素原子 = 1 : 16
- 問9 酸化銀の熱分解という反応について、化学変化の種類の観点から説明したものととして最も適切なものはどれですか。 （2016年 群馬県公立入試 類似）
1. 1種類の物質が、熱のエネルギーによって2種類以上の異なる物質に分かれる反応である。                      2. 2種類以上の物質が結びついて、それらとは異なる1種類の新しい物質ができる反応である。                      3. 酸化物から酸素が取り除かれ、もとの物質に戻る反応である。                      4. 物質が酸素と激しく反応して、光や熱を出しながら別の物質に変わる反応である。
- 問10 溶鉱炉を用いた鉄の精錬において、鉄鉱石の主成分である酸化鉄から酸素を取り除いて鉄を取り出す化学変化を何といいますか、最も適切な名称を答えなさい。 （2023年 神奈川県公立入試 類似）
1. 還元                      2. 熱分解                      3. 酸化                      4. 中和
- 問11 炭酸水素ナトリウムを加熱して分解したときに、試験管の底に白い固体として残る物質の名称を選びなさい。 （2022年 青森県公立入試 類似）
1. 酸化ナトリウム                      2. 水酸化ナトリウム                      3. 炭酸ナトリウム                      4. 塩化ナトリウム
- 問12 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、熱分解させたときに発生する3種類の物質の組み合わせとして適切なものはどれですか。 （2018年 岩手県公立入試 類似）
1. 酸化ナトリウム、水素、二酸化炭素                      2. 炭酸ナトリウム、水素、二酸化炭素                      3. 酸化ナトリウム、水、酸素                      4. 炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素
- 問13 酸化銅と炭素の混合物を加熱し、発生した気体をガラス管で導いて石灰水に通したところ、石灰水が白く濁りました。この実験における炭素の働きと変化について正しく述べたものはどれですか。 （2021年 山口県公立入試 類似）
1. 炭素は酸化銅に酸素を与えて自身は酸化され、一酸化炭素になった。                      2. 炭素は酸化銅から酸素を奪って自身は還元され、二酸化炭素になった。                      3. 炭素は触媒として働き、酸化銅が酸素を放出するのを助けたが自身は変化しなかった。                      4. 炭素は酸化銅から酸素を奪って自身は酸化され、二酸化炭素になった。
- 問14 酸化銅4.0gと炭素の粉末を混ぜ合わせて加熱し、酸化銅をすべて還元させる実験を行います。炭素の質量を、過不足なく反応する0.3gよりも多い0.6gにして加熱した場合、反応後の試験管に残っている固体の物質の組み合わせとして適切なものはどれか、選びなさい。 （2024年 群馬県公立入試 類似）
1. 炭素と酸化銅                      2. 銅のみ                      3. 銅と炭素                      4. 銅と酸化銅