

- 問1 アンモニアは空気よりも密度が小さい気体ですが、一般的に水上置換法で集めるのには適していません。その理由を説明したものとして正しいものはどれですか。 (2021年 福井県公立入試 類似)
1. アンモニアは水よりも密度が大きく、水槽の底に沈んでしまうから。
 2. アンモニアを水に通すと、激しい化学反応を起こして爆発する危険があるから。
 3. アンモニアは水に非常に溶けやすい性質を持っているから。
 4. アンモニアは空気と触れるとすぐに反応して別の物質に変わるから。
- 問2 硝酸カリウムを高い温度の水に溶かして飽和水溶液を作った後、この水溶液の温度をゆっくり下げていくと、溶けきれなくなった分が結晶として現れます。このように、温度による溶解度の差を利用して物質を純粋な結晶として取り出す操作の名称として適切なものを選びなさい。 (2019年 島根県公立入試 類似)
1. 昇華
 2. ろ過
 3. 再結晶
 4. 蒸留
- 問3 表面に体積を示す細かな目盛りがついており、液体の体積を精密に測定するために用いられる、底面に安定させるための台座がついた細長い円筒形の器具の名称を答えなさい。 (2018年 島根県公立入試 類似)
1. ピーカー
 2. 駒込ピペット
 3. メスシリンダー
 4. 三角フラスコ
- 問4 融点が63度、沸点が360度である物質工があります。この物質工を100度まで加熱したときの状態と、その理由の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 (2020年 鹿児島県公立入試 類似)
1. 100度は水の沸点と同じであるため、気体である。
 2. 融点よりも高いが沸点よりは低いため、液体である。
 3. 融点が0度よりも高いため、固体である。
 4. 沸点が100度よりも高いため、気体である。
- 問5 エタノールと水の混合物を加熱し、その温度変化を調べる実験を行いました。このとき、混合物が沸騰している最中の温度変化について、正しい説明を選びなさい。 (2026年 和歌山県公立入試 類似)
1. 沸騰が始まっても温度は一定にならず、緩やかに上昇し続ける
 2. 沸騰が始まると、熱がすべて気化に使われるため温度は下がり始める
 3. 沸騰が始まると、液体の量が減るのに比例して急激に温度が上がる
 4. 沸騰が始まると、液体の量に関わらず温度は一定に保たれる
- 問6 プラスチックの密度を算出する実験において、得られた数値からその物質が「ポリ塩化ビニル」であると判断できる根拠として最も適切なものはどれか。 (2023年 長崎県公立入試 類似)
1. 密度を計算した結果が、約1.20g/cm³から1.60g/cm³の範囲に含まれていること
 2. 体積を質量で割った値 (cm³/g) が、約0.67となること
 3. 質量 (g) と体積 (cm³) の数値を加算した結果が、既知のデータと一致すること
 4. 密度を計算した結果が、水 (1.00 g/cm³) よりも小さい値を示すこと
- 問7 少量の不純物が混ざった硝酸カリウムから、純粋な硝酸カリウムの結晶を取り出すために再結晶という操作が行われます。この操作が、物質を純粋にするために有効である理由として正しいものはどれですか。 (2018年 福島県公立入試 類似)
1. 結晶ができる際、不純物は液中に残ったまま、目的の物質だけが規則正しく並ぼうとするから
 2. ろ紙を通すことで、粒子の大きい不純物だけが取り除かれるから
 3. 水溶液を冷やすと、不純物の溶解度が急激に増加して溶媒に溶け込むから
 4. 加熱することで不純物だけが先に蒸発し、目的の物質だけが結晶として残るから
- 問8 水とエタノールの混合物を一定の火力で加熱し、時間と温度の変化を記録した。加熱開始から数分が経過し、温度上昇の傾きが変化して液体内部から気泡が発生し始めたとき、混合物の温度の状態について述べたものとして正しいものはどれか。 (2022年 長野県公立入試 類似)
1. 沸騰が始まっても、温度は一定にならずに上がり続ける
 2. 沸騰が始まった瞬間に、温度の上昇は止まり一定になる
 3. 沸騰が始まると、加熱を続けても温度上昇の傾きは全く変化しない
 4. 沸騰が始まると、液体の状態変化に熱が使われるため温度が下がる
- 問9 一定の温度の水に物質を溶かしていくとき、それ以上溶けることができなくなった状態の溶液を何というか。また、水100gに溶けることができる溶質の最大質量の名称とあわせて、正しい組み合わせを選びなさい。 (2022年 福島県公立入試 類似)
1. 飽和水溶液 ・ 溶解度
 2. 飽和水溶液 ・ 質量パーセント濃度
 3. 水溶液 ・ 溶解度
 4. 純粋な物質 ・ 密度
- 問10 炭酸水素ナトリウムの熱分解実験において、加熱する試験管の口を、試験管の底よりもわずかに下げて固定して実験を行いました。このように装置を組み立てる理由として、正しい説明はどれですか。 (2015年 富山県公立入試 類似)
1. 試験管内の空気をあらかじめ追い出し、気体の純度を高めるため
 2. 反応によって生じた液体が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため
 3. 加熱によって生じる固体の物質が試験管の口に詰まり、破裂するのを防ぐため
 4. 発生した気体は空気よりも密度が大きいため、試験管の外に排出しやすくするため
- 問11 60℃の水100gに塩化ナトリウムを38g溶かして飽和水溶液を作りました。この水溶液の温度を10℃まで下げたとき、出てくる結晶の量について考察したものとして適切なものはどれですか。なお、10℃の水100gに対する塩化ナトリウムの溶解度は約35.8gとします。 (2025年 滋賀県公立入試 類似)
1. 塩化ナトリウムは温度が低いほどよく溶ける性質があるため、結晶は一切出てこない。
 2. 温度が大幅に下がるため、20g以上の大量の結晶が出てくる。
 3. 温度が下がっても溶解度がほとんど変わらないため、出てくる結晶は約2g程度と少ない。
 4. 10℃では溶解度が0になるため、溶けていた38gすべてが結晶として出てくる。
- 問12 10立方センチメートルの水に対し、塩化カルシウムを0g、1g、2gとそれぞれ溶かした3種類の液体を用意しました。これらを冷却したところ、塩化カルシウムを溶かしていない水は0度で凍り始め、1g溶かした水溶液はマイナス5度、2g溶かした水溶液はマイナス10度で凍り始めました。この実験結果から導き出される結論として、正しいものはどれですか。 (2020年 東京都公立入試 類似)
1. 塩化カルシウムを水に溶かすと、水溶液の沸点が0度よりも低くなる。
 2. 水溶液の濃度に関わらず、液体が凍り始める温度は常に一定である。
 3. 水溶液に溶けている溶質の量が多いほど、凝固点は高くなる。
 4. 水溶液に溶けている溶質の量が多いほど、凝固点は低くなる。
- 問13 溶質・溶媒・溶液の関係性について正しく述べたものはどれか、次の説明から選びなさい。 (2014年 佐賀県公立入試 類似)
1. 溶媒は、液体に溶けている物質自体のことである。
 2. 溶媒は、一定量の液体に溶けることができる溶質の限界量のことである。
 3. 溶媒は、溶質が溶媒に溶けて均一に混ざった液体全体のことである。
 4. 溶媒は、他の物質を溶かしている液体のことである。