

1. 胚珠 2. 子房 3. やく 4. 花粉

1. 胚珠 2. 花粉のう 3. 子房 4. やく

1. 柱頭がないため、風で運ばれた花粉が直接、りん片にある胚珠に付着する
2. 花粉が飛散して、雌花のりん片にある子房の中へ入り込むことで受粉が完了する
3. 雄花のりん片にある「やく」から出た花粉が、雌花の中にある胚珠と受精する
4. 昆虫が蜜を求めてやってきた際に、花粉が雌花の柱頭に付着する

1. 水中の不純物をろ過して、体内にゴミが入るのを防ぐため	2. えらの強度を高めて、水の流れによる破損を防ぐため	3. 水を蓄える隙間を増やして、陸上でも呼吸が続けられるようにするため	4. 水との接触面積を大きくして、酸素を効率よく取り入れるため
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

1. 単子葉類 2. 双子葉類 3. 裸子植物 4. コケ植物

1. シダ植物 2. 裸子植物 3. 双子葉類 4. 単子葉類

1. 体全体が柔らかい皮膚でおおわれ、筋肉だけで移動する。
2. 内臓が外套膜（がいとうまく）でおおわれており、体やあしに節がない。
3. 体の内部に背骨があり、それによって筋肉を支えている。
4. 体やあしに節（ふし）があり、体の表面が外骨格でおおわれている。

1. 乾燥したうろこで覆われており、陸上での水分の蒸発を防いでいる。
2. 粘液で湿った皮膚になっており、肺呼吸を補うために皮膚呼吸も行っている。
3. 硬い毛で覆われており、外敵の刺激から身を守っている。
4. 羽毛で覆われており、水中でも体温が下がらないようにしている。

1. 兩生類 2. 哺乳類 3. 鳥類 4. 爬虫類

1. 維管束が輪の形に並んでおり、道管が内側、師管が外側に位置している	2. 維管束が輪の形に並んでおり、師管が内側、道管が外側に位置している	3. 維管束が茎の中心に一つにまとまっており、太い管を形成している	4. 維管束が茎の全体に散らばっており、特に周辺部に多く集まっている
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

1. 根の先端に近い部分の印の間隔が、他の部分よりも大きく広がる。

2. すべての印の間隔が、元の比率を保ったまま等しく広がる。

3. 根の中央部分の印の間隔が、他の部分よりも大きく広がる。

4. 根の基部に近い部分の印の間隔が、他の部分よりも大きく広がる。

1. 左上の方向 2. 右下の方向 3. 真左の方向 4. 真上の方向

1. どちらの仲間も親が子に母乳を与えて育てる習性があるから。 2. どちらの仲間も皮膚呼吸と気孔による呼吸を組み合わせで行っているから。 3. どちらの仲間も体に背骨をもつという骨格上の共通点があるから。 4. どちらの仲間も成長の過程でえら呼吸から肺呼吸へと変化するから。

1. 側根 2. ひげ根 3. 主根 4. 維管束

答え合わせ・解説

問1	答え 1 胚珠	植物の花のつくりにおいて、めしべの根元のふくらんだ部分は子房と呼ばれます。その子房の中にある小さな粒のような組織が胚珠です。胚珠は受粉が行われた後に成長し、最終的に種子となる重要な役割を持っています。
問2	答え 1 胚珠	種子植物の雌花にある組織で、将来的に種子へと発達する部分は胚珠と呼ばれます。被子植物では胚珠が子房の中に包まれています。マツなどの裸子植物では子房がなく、胚珠がりん片の根元にむき出しの状態が付着しているのが特徴です。
問3	答え 1 柱頭がないため、風で運ばれた花粉が直接、りん片にある胚珠に付着する	裸子植物には被子植物にある「めしべ」の構造が存在せず、特に花粉を受け取るための「柱頭」がありません。そのため、雄花の花粉のうから飛散した花粉は、雌花のりん片にむき出しの状態です。内臓が外套膜で包まれているのはマイマイ（カタツムリ）などの軟体動物の特徴であり、背骨を持つのは脊椎動物の特徴です。観察のポイントとして、これらの節の有無や表面の硬さに注目することが重要です。
問4	答え 4 水との接触面積を大きくして、酸素を効率よく取り入れるため	水中に溶けている酸素の量は、空気中に比べて非常にわずかです。効率よくガス交換を行うためには、水に触れる面積を増やす必要があります。えらがたくさんの薄い膜に分かれているのは、表面積を最大限に広げることで、限られた酸素を効率的に血液中に取り込むための工夫です。
問5	答え 2 双子葉類	被子植物は子葉の数によって2つのグループに大別されます。子葉が1枚のものを単子葉類、2枚のものを双子葉類と呼びます。双子葉類には、葉脈が網目状の「網状脈」であることや、根が主根と側根から成るなどの共通した特徴があります。
問6	答え 4 単子葉類	被子植物は発芽したときの子葉の数によって分類される。子葉が1枚のものは単子葉類、2枚のものは双子葉類と呼ばれる。単子葉類には、葉脈が平行である（平行脈）という特徴や、根がひげ根になるという共通の性質がある。
問7	答え 4 体やあしに節（ふし）があり、体の表面が外骨格でおおわれている。	ダンゴムシ、ムカデ、クモなどはすべて節足動物に分類されます。節足動物の大きな特徴は、体やあしに多くの「節（ふし）」があることと、体の表面が硬い「外骨格」でおおわれていることです。内臓が外套膜でおおわれているのはマイマイ（カタツムリ）などの軟体動物の特徴であり、背骨を持つのは脊椎動物の特徴です。観察のポイントとして、これらの節の有無や表面の硬さに注目することが重要です。
問8	答え 2 粘液で湿った皮膚になっており、肺呼吸を補うために皮膚呼吸も行っている。	両生類のカエルは、魚類と異なり体表にうろこを持たず、常に湿った状態の皮膚を持っている。この湿った皮膚には毛細血管が発達しており、肺呼吸だけでなく皮膚を通した呼吸（皮膚呼吸）を行うことで酸素を取り入れている。
問9	答え 2 哺乳類	一生を肺で呼吸すること、体表が毛で覆われていること、そして子が親の体内で成長してから生まれる「胎生」という特徴は、ヒト、イヌ、クジラなどが属する哺乳類に共通する性質です。
問10	答え 1 維管束が輪の形に並んでおり、道管が内側、師管が外側に位置している	葉脈が網目状であることから、この植物は双子葉類であると判断できます。双子葉類の茎では維管束が輪の形に並ぶ規則性があり、その内部構造は、根から吸い上げた水や肥料分が通る「道管」が茎の中心側に、葉で作られた養分が通る「師管」が外側に配置されています。
問11	答え 1 根の先端に近い部分の印の間隔が、他の部分よりも大きく広がる。	植物の根は、先端付近にある成長点で細胞分裂が盛んに行われ、新しく作られた細胞が縦方向に伸びることで成長する。そのため、基部側よりも先端に近い部分ほど、時間の経過とともに印の間隔が大きく広がることになる。
問12	答え 2 右下の方向	顕微鏡の像は上下左右が逆に見えるため、視野の中での動きと実際の物体の動きは逆になります。そのため、生物が逃げていった「右下」の方向へそのままスライドガラスを動かすことで、視野の中では生物が中央に向かって戻ってくるように見えます。
問13	答え 3 どちらの仲間も体に背骨をもつという骨格上の共通点があるから。	セキツイ動物は、子の生まれ方や呼吸のしかたにかかわらず、「体に背骨をもつ」という骨格の共通点によって分類されます。両生類のカエルも哺乳類のウサギも、骨格の中心に背骨をもつためセキツイ動物に分類されます。
問14	答え 1 側根	アジサイは双子葉類に分類されるため、根のつくりは主根と側根に分かれています。中心にある太い根が主根であり、その主根から横に伸びるように分かれている細い根を側根と呼びます。赤インクを吸い上げることで、これらの根が水分を吸収する役割を担っていることが確認できます。