

問1 日本国内で地震が発生した際、ある地点における「揺れの強さ」を表すために用いられる指標の名称と、その段階数の組み合わせとして正しいものはどれか。なお、この指標の最小値は0、最大値は7である。 (2022年 佐賀県公立入試 類似)

1. マグニチュードで、8段階
2. マグニチュードで、10段階
3. 気象庁震度階級で、8段階
4. 気象庁震度階級で、10段階

問2 ある地層から三葉虫の化石が発見された。このことから判断できる内容と、その理由について述べた文として正しいものはどれか。 (2022年 岐阜県公立入試 類似)

1. この地層が堆積した当時は暖かく浅い海であったことがわかる。三葉虫は特定の環境でのみ生息できるため、当時の環境を示す示相化石となるから。
2. この地層は古生代に堆積したことがわかる。三葉虫は生存期間が限定されており、広い範囲に生息していたため、堆積年代を特定する示準化石となるから。
3. この地層が堆積した当時は寒冷な気候であったことがわかる。三葉虫は特定の環境でのみ生息できるため、当時の環境を示す示相化石となるから。
4. この地層は中生代に堆積したことがわかる。三葉虫は生存期間が限定されており、広い範囲に生息していたため、堆積年代を特定する示準化石となるから。

問3 地震の規模を表す「マグニチュード」と、各地点での揺れの強さを表す「震度」の関係について説明したものと、最も適切な記述を選択してください。 (2019年 福井県公立入試 類似)

1. 震度は地震そのもののエネルギーの大きさを表し、マグニチュードは揺れの広がりを段階的に表したものである。
2. マグニチュードは地震ごとに決まる1つの値であり、一般に震源から遠ざかるほど震度は小さくなる。
3. マグニチュードは観測地点の地盤の揺れやすさによって決まるため、1つの地震に対して複数の値が存在する。
4. マグニチュードが同じ地震であれば、震源からの距離に関わらず、各地の震度はすべて同じになる。

問4 地震が発生した際、最初に観測される小さな揺れを初期微動といいますが、この初期微動を伝える波の名称として正しいものを選択肢から選びなさい。 (2019年 長野県公立入試 類似)

1. 主要動
2. P波
3. S波
4. 初期微動継続時間

問5 川から海へ運ばれた土砂が海底に堆積して地層をつくるとき、粒の大きさが2mm以上の「れき」と、さらに粒が小さい「砂」、そして最も粒が小さい「泥」では、堆積する場所に違いが見られます。これら3種類の堆積物について、陸からの距離と粒の大きさの関係を説明したものと、最も適切なものはどれですか。 (2026年 広島県公立入試 類似)

1. 粒の大きさが小さい「泥」ほど、陸から遠い沖合まで運ばれて堆積する。
2. 粒の大きさが中程度の「砂」が、最も陸から遠い場所に堆積する。
3. 粒の大きさが大きい「れき」ほど、陸から遠い沖合まで運ばれて堆積する。
4. 堆積物の粒の大きさに関わらず、すべて陸から同じ距離の場所に堆積する。

問6 地下深くでマグマが非常に長い時間をかけてゆっくりと冷えて固まった深成岩に見られる、肉眼で見分けられる大きさの鉱物のみが隙間なく組み合わさっている組織の名称を答えなさい。 (2024年 三重県公立入試 類似)

1. 層状組織
2. 非晶質組織
3. 等粒状組織
4. 斑状組織

問7 同一の地震が発生した際、観測地点における震源からの距離と、地震の波の到達時間および震度の一般的な関係について述べたものとして正しいものはどれですか。 (2025年 群馬県公立入試 類似)

1. 震源からの距離が遠くなるほど、波が到達するまでの時間は短くなり、震度は小さくなる。
2. 震源からの距離が遠くなるほど、波が到達するまでの時間は長くなり、震度は大きくなる。
3. 震源からの距離が遠くなるほど、波が到達するまでの時間は短くなり、震度は大きくなる。
4. 震源からの距離が遠くなるほど、波が到達するまでの時間は長くなり、震度は小さくなる。

問8 地層が水平ではなく一定の方向に傾いている状態を調べるとき、複数の地点で調査した結果を柱状に表した図を比較して分析を行います。このとき、地層が低くなっている方を正しく特定するための手順として、最も適切な説明はどれですか。 (2024年 高知県公立入試 類似)

1. 各地点の柱状図を、地表の標高を揃えて並べることで、同じ層が深くなる方角を探す
2. 柱状図に示された地層の厚さを比較し、層が最も厚くなっている方角を特定する
3. 地表面の標高が最も高い地点を探し、その地点から最も遠い方角を特定する
4. 地表の標高と、柱状図からわかる地表からの深さを照らし合わせ、鍵層の海拔を比較する

問9 地下深くでマグマがゆっくりと冷え固まってできた深成岩のうち、無色鉱物を多く含むため全体的に白っぽい見た目の持つ岩石の名称を答えなさい。 (2017年 岡山県公立入試 類似)

1. 玄武岩
2. 安山岩
3. 花こう岩
4. 流紋岩

問10 生物の遺骸が堆積してできた堆積岩のうち、サンゴやフズリナなどの石灰質の殻を持つ生物を主成分とし、うすい塩酸をかけると気体が発生する岩石の名称として適切なものはどれですか。 (2015年 京都府公立入試 類似)

1. 石灰岩
2. 凝灰岩
3. 安山岩
4. チャート

問11 ある地域で地質の調査を行ったところ、北側に位置する地点Pでは鍵層となる凝灰岩の層が標高115mの高さで確認されました。一方、地点Pから真南に離れた地点Qと地点Rでは、同じ凝灰岩の層が標高95mの高さで確認されました。この地域の地層に曲がりやずれがなく、一定の方向に傾いて広がっているものとする、地層はどの方角に向かって低くなるように傾いていますか。 (2018年 福岡県公立入試 類似)

1. 東
2. 西
3. 北
4. 南

問12 マグマが地表付近で急激に冷えて固まってできた火山岩のうち、流紋岩と比較して有色鉱物を多く含み、全体的に黒っぽい色をした岩石の名称と、その岩石に含まれる代表的な有色鉱物の組み合わせとして適切なものはどれですか。 (2016年 長崎県公立入試 類似)

1. 岩石名：玄武岩、有色鉱物：輝石
2. 岩石名：玄武岩、有色鉱物：セキエイ
3. 岩石名：流紋岩、有色鉱物：輝石
4. 岩石名：流紋岩、有色鉱物：セキエイ

問13 地層の観察において、ある断層が「しゅう曲」よりも後に形成されたと判断できる根拠として、最も適切な説明はどれですか。 (2026年 茨城県公立入試 類似)

1. 断層の上部に浸食された面があり、新しい地層が重なっているため。
2. しゅう曲している地層の中に、示準化石が含まれていないため。
3. 断層の傾きが、しゅう曲している地層の傾きよりも急であるため。
4. 断層が、すでに曲がっている地層の構造を断ち切るように走っているため。