

- 問1 イカ、イヌ、ニワトリ、イモリの4種類の動物について、体のつくりや子の生まれ方の特徴から分類することを考えます。イモリを他の3種類の動物と区別する際の説明として、最も適切なものはどれですか。 (2023年 愛媛県公立入試 類似)
- | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. 背骨を持っていない点でイカと共通しており、ニワトリと同じく殻のある卵を産むという特徴 | 2. 背骨を持っていない点でイヌやニワトリと区別され、イカと同じグループに属するという特徴 | 3. 背骨を持っており、ニワトリとは異なり殻のない卵を産むという特徴 | 4. 背骨を持っており、イヌと同じようにメスが子を直接産む（胎生）という特徴 |
|---|---|------------------------------------|--|
- 問2 魚類や甲殻類のように、一生を通じて水中で生活する動物が、水に溶けている酸素を取り入れるために行う呼吸を何というか、名称を答えなさい。 (2025年 山口県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 肺呼吸 | 2. えら呼吸 | 3. 気門呼吸 | 4. 皮膚呼吸 |
|--------|---------|---------|---------|
- 問3 根の先端付近の断面を顕微鏡で観察したときの、根毛の構造的な特徴について説明したものとして正しいものを選びなさい。 (2024年 長崎県公立入試 類似)
- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1. 根の内部にある細胞がバラバラになり、土の隙間に向かって移動したものである。 | 2. 道管が根の表面を突き破って外側に露出し、水分を直接取り込むようになったものである。 | 3. 根の表面にある表皮細胞のひとつが、外側に向かって細長く伸び出したものである。 | 4. 細胞分裂を行うための特別な細胞が糸状に連なり、新しい根を形成しようとしている状態である。 |
|--|--|---|---|
- 問4 アブラナの花を台紙上でピンセットを用いて分解し、各部分の数を観察しました。観察された各部分の枚数や本数の組み合わせとして正しいものはどれですか。 (2025年 宮崎県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. がく4枚、花弁4枚、おしべ6本、めしべ1本 | 2. がく5枚、花弁5枚、おしべ6本、めしべ1本 | 3. がく4枚、花弁4枚、おしべ4本、めしべ2本 | 4. がく6枚、花弁6枚、おしべ4本、めしべ1本 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
- 問5 アブラナやタンポポなどの双子葉類の植物において、中心にある太い根から枝分かれするように伸びる細い根を何といいますか。 (2023年 北海道公立入試 類似)
- | | | | |
|--------|-------|-------|--------|
| 1. ひげ根 | 2. 側根 | 3. 主根 | 4. 不定根 |
|--------|-------|-------|--------|
- 問6 スギゴケを観察すると、茎の先端に袋のようなつくりが見られることがあります。このつくりに関する説明として最も適切なものはどれですか。 (2025年 埼玉県公立入試 類似)
- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 胞子のうと呼ばれ、中には仲間を増やすための胞子が入っている。 | 2. 脂肪と呼ばれ、成長に必要な栄養分が蓄えられている。 | 3. やくと呼ばれ、受粉のために必要な花粉が詰まっている。 | 4. 胚のうと呼ばれ、受精して種子になるための卵細胞が入っている。 |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
- 問7 脊椎動物の分類において、コウモリはハトと同じように空を飛ぶためのつばさを持っていますが、ハトは鳥類、コウモリは哺乳類に分類されます。コウモリが哺乳類に分類される根拠となる、ハトとは異なる特徴として適切なものはどれですか。 (2024年 新潟県公立入試 類似)
- | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1. 一生を肺で呼吸すること | 2. 子が母親の体内で育ってから生まれること | 3. 背骨を持っていること | 4. 殻のある卵を陸上に産むこと |
|----------------|------------------------|---------------|------------------|
- 問8 ある植物のつくりを観察したところ、葉には中心から先端に向かって平行な筋が見られ、根は中心となる太い根が見当たらない多数の細い根が広がった状態でした。この植物の特徴および分類について述べた文として、最も適切なものはどれですか。 (2026年 和歌山県公立入試 類似)
- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 子葉が2枚である双子葉類に分類され、代表的な植物にトウモロコシがある | 2. 子葉が1枚である双子葉類に分類され、代表的な植物にホウセンカがある | 3. 子葉が2枚である単子葉類に分類され、代表的な植物にアブラナがある | 4. 子葉が1枚である単子葉類に分類され、代表的な植物にツユクサがある |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
- 問9 アブラムシやテントウムシのように、体やあしに「節（ふし）」があり、体の外側が硬い殻で覆われている特徴を持つ動物のグループを何といいますか。 (2026年 群馬県公立入試 類似)
- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. 環形動物 | 2. 軟体動物 | 3. 脊椎動物 | 4. 節足動物 |
|---------|---------|---------|---------|
- 問10 接眼レンズ（10倍、15倍）と対物レンズ（4倍、10倍）がそれぞれ用意されている。これらのレンズを組み合わせると同じプレパラートを観察したとき、最も視野が広がる組み合わせはどれか。 (2023年 鹿児島県公立入試 類似)
- | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. 15倍の接眼レンズと4倍の対物レンズ | 2. 15倍の接眼レンズと10倍の対物レンズ | 3. 10倍の接眼レンズと10倍の対物レンズ | 4. 10倍の接眼レンズと4倍の対物レンズ |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
- 問11 同じ種類の植物の葉の「表側」にワセリンを塗ったものと、「裏側」にワセリンを塗ったものを準備し、放出される水蒸気の量を比較したところ、裏側に塗ったものの方が水蒸気の放出量が著しく少なくなった。この結果からわかる葉のつくりに関する特徴として、最も適切なものはどれか。 (2015年 群馬県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 葉の表側には、水蒸気の出口となる気孔が全く存在しない。 | 2. ワセリンが光を遮ることにより、葉の裏側で光合成が行われなくなったため。 | 3. 植物は葉の裏側からしか水分を吸収することができない。 | 4. 葉の裏側には、水蒸気の出口となる気孔が表側よりも多く分布している。 |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
- 問12 コケ植物の体のつくりと、その特徴について説明した文として、最も適切なものはどれか。 (2017年 徳島県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. 維管束は持っていないが、根・茎・葉の区別は明確である。 | 2. 維管束を持ち、根・茎・葉の区別が明確である。 | 3. 維管束は持っているが、根・茎・葉の区別は明確ではない。 | 4. 維管束を持たず、根・茎・葉の区別が明確ではない。 |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
- 問13 ハチュウ類は、両生類と異なり乾燥した陸上でも生活を広げることができました。その理由の一つとして、ハチュウ類が産む卵の性質について正しく説明しているものはどれか。 (2021年 長崎県公立入試 類似)
- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 1. 殻のない卵を湿った場所に産むことで、親がつきっきりで守らなくてもよいようにしている | 2. 卵の殻を通じて周囲の水分を吸収し、乾燥した場所でも卵が成長できるようにしている | 3. 水中に卵を産む必要がないため、親の体温で卵を温めてふ化を早めている | 4. 殻のある卵を産むことで、卵の内部の水分が蒸発して乾燥するのを防いでいる |
|--|--|--------------------------------------|--|