

- 問1 物質は、大きく「純粋な物質」と「混合物」に分けられ、さらに純粋な物質は「単体」と「化合物」に分類されます。このうち、「単体」の定義として最も適切なものはどれですか。 (2023年 和歌山県公立入試 類似)

1. 2種類以上の純粋な物質が混ざり合っている物質

2. 2種類以上の元素から構成されている純粋な物質

3. ただ1種類の元素から構成されている純粋な物質

4. 加熱などの化学変化によって、それ以上分けることができない物質
- 問2 鉄粉と硫黄の混合物を加熱して別の物質に変化させたとき、反応後の物質が持つ性質について述べたものとして、最も適切なものはどれですか。 (2021年 島根県公立入試 類似)

1. 磁石を近づけても引きつけられなくなる

2. 加熱前と同様に、葉さじでこすると特有の金属光沢が現れる

3. 磁石を近づけると、加熱前の混合物のときよりも強く引きつけられる

4. 水に溶かすと、鉄がイオンとなって溶け出し、青色の水溶液になる
- 問3 元素記号Hで表され、すべての気体の中で最も密度が小さく（最も軽く）、宇宙で最も多く存在している物質の名称として適切なものはどれか。 (2017年 北海道公立入試 類似)

1. 酸素

2. 水素

3. 窒素

4. ヘリウム
- 問4 炭酸水素ナトリウムを用いた化学変化の実験において、試験管に入れた炭酸水素ナトリウムを加熱したときに発生する気体として正しいものはどれか。 (2023年 愛知県公立入試 類似)

1. 二酸化炭素

2. 水素

3. 酸素

4. アンモニア
- 問5 試験管に入れた物質をガスバーナーで加熱したところ、試験管の口付近に無色透明の液体がたまった。この液体が水であることを確かめるための操作と、観察される現象の説明として適切なものを選びなさい。 (2019年 北海道公立入試 類似)

1. 赤色のリトマス紙を液体につけると、青色に変化する

2. 青色の塩化コバルト紙を液体につけると、赤色に変化する

3. ペネシクト液を液体に加えて加熱すると、赤褐色の沈殿ができる

4. ヨウ素液を液体に数滴滴下すると、青紫色に変化する
- 問6 化学変化にはいくつかの種類がありますが、炭酸水素ナトリウムを加熱したときと同じ種類の化学変化に分類されるものはどれですか。 (2014年 沖縄県公立入試 類似)

1. 木炭を燃焼させると、二酸化炭素が発生した

2. 酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分かれた

3. 鉄粉と硫黄の混合物を加熱すると、硫化鉄になった

4. 使い捨てカイロの中の鉄粉が、空気中の酸素と反応して熱を出した
- 問7 鉄粉と硫黄の粉末を試験管に入れて加熱し、硫化鉄を作る実験において、反応が完全に終わったことを確認するための方法と結果の組み合わせとして、最も適切なものはどれですか。 (2025年 新潟県公立入試 類似)

1. 生成した物質の質量を量り、反応前の鉄粉と硫黄の合計質量よりも減少していることを確認する。

2. 生成した物質に磁石を近づけたとき、鉄のように引き寄せられないことを確認する。

3. 生成した物質を水に入れてかき混ぜたとき、すべてがきれいに溶けきることを確認する。

4. 生成した物質にうすい塩酸を加えたとき、鉄と同じように水素が発生することを確認する。
- 問8 ある気体を発生させる実験において、「石灰石にうすい塩酸を加える操作」や「二酸化マンガンを過酸化水素水を加える操作」と比較したとき、「亜鉛にうすい塩酸を加える操作」で発生する気体へのみ見られる特徴はどれですか。 (2020年 岡山県公立入試 類似)

1. 発生した気体の中に火のついた線香を入れると、炎を上げて激しく燃える。

2. 発生した気体に火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。

3. 発生した気体を石灰水に通すと、反応して白く濁る。

4. 発生した気体は空気よりも非常に重く、下方置換法で集めることができる。
- 問9 酸化銅と炭素粉末の混合物を試験管に入れてガスバーナーで加熱し、発生した気体をガラス管を通して別の試験管に入れた石灰水に通す実験を行いました。加熱を終えて火を消す際、試験管の破損を防ぐために最初に行わなければならない操作として適切なものはどれですか。 (2024年 奈良県公立入試 類似)

1. ガラス管の先を石灰水の中から外に出す

2. ガスバーナーの火を消してからガラス管を抜く

3. 石灰水の入った試験管にゴム栓をして密閉する

4. ゴム管をピンチコックで強く閉じてから火を消す
- 問10 アルミニウムはくの筒に鉄粉と硫黄の混合物を詰め、その一端をガスバーナーで加熱したところ、混合物が赤く光り始めました。この直後にガスバーナーの火を止めたとき、その後の反応の様子として正しいものはどれですか。 (2015年 奈良県公立入試 類似)

1. 加熱をやめると温度が下がり、硫黄だけが先に蒸発して鉄が残る。

2. 反応は継続するが、混合物の色が徐々に白っぽく変化していく。

3. 外部からの加熱がなくなったため、すぐに反応が止まる。

4. 赤く光る部分が混合物全体に広がり、外部から加熱しなくても反応が進む。
- 問11 密閉した容器の中で、7.0gの鉄粉と4.0gの硫黄の粉末を混ぜ合わせて加熱し、過不足なく反応させて硫化鉄を作りました。このとき生成された硫化鉄の質量は何gですか。 (2022年 茨城県公立入試 類似)

1. 11.0g

2. 7.0g

3. 28.0g

4. 3.0g
- 問12 黒色の酸化銀を試験管に入れ、ガスバーナーで加熱する実験を行いました。加熱後の試験管の底に残った白色の固体について、これが金属であることを確かめる方法と結果の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 (2025年 和歌山県公立入試 類似)

1. 葉さじの背などでこすると、銀特有の金属光沢が現れることを確認する。

2. 水に入れてよく振り、青色の水溶液に変化することを確認する。

3. 磁石を近づけると、鉄のように強く引きつけられることを確認する。

4. 石灰水に通すと、石灰水が白く濁ることを確認する。
- 問13 酸化銀を加熱して発生した気体を水上置換法で試験管に集め、その中に火のついた（赤く光っている状態の）線香を入れたとき、どのような現象が観察されますか。 (2021年 沖縄県公立入試 類似)

1. 線香の周りに白い煙が立ち込める

2. 「ボン」と音を立てて気体が燃える

3. 線香の火がすぐに消える

4. 線香が炎を上げて激しく燃える