

- 問1 ある地震について、地点Aと地点Bで地震計による観測を行いました。地点Aでは初期微動が始まってから主要動が始まるまでの時間が5秒間であり、地点Bでは10秒間でした。このとき、地点Aおよび地点Bの震源からの距離について述べたものとして、最も適切な説明を選んでください。
(2017年 兵庫県公立入試 類似)
- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 地点Aの方が、地点Bよりも震源からの距離が近い。 | 2. 初期微動が続く時間と、震源からの距離には関係がない。 | 3. 地点Aと地点Bは、震源からの距離が同じである。 | 4. 地点Bの方が、地点Aよりも震源からの距離が近い。 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
- 問2 ある火成岩を観察したところ、数mm程度のほぼ同じ大きさの鉱物の結晶が、すき間なく組み合わさっていることがわかりました。このような岩石の組織の名称と、その組織が形成される条件の組み合わせとして適切なものはどれか答えなさい。
(2015年 愛知県公立入試 類似)
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. 等粒状組織と呼ばれ、マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まることで形成される。 | 2. 斑状組織と呼ばれ、マグマが地表付近で急激に冷えて固まることで形成される。 | 3. 斑状組織と呼ばれ、マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まることで形成される。 | 4. 等粒状組織と呼ばれ、マグマが地表付近で急激に冷えて固まることで形成される。 |
|---|---|--|--|
- 問3 火山岩の一種である「玄武岩」の特徴について述べたものとして、適切なものはどれですか。有色鉱物の割合と、岩石全体の外見上の色の特徴に着目して選びなさい。
(2018年 三重県公立入試 類似)
- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 有色鉱物の割合が多く、岩石全体の色は白っぽい | 2. 有色鉱物の割合が多く、岩石全体の色は黒っぽい | 3. 有色鉱物の割合が少なく、岩石全体の色は白っぽい | 4. 有色鉱物の割合が中程度で、岩石全体の色は白っぽい |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
- 問4 地震が発生した際、震源の真上に当たる地表の地点を「震央」と呼びます。複数の観測地点でのデータを用いて、この震央の位置を地図上で特定するための方法として最も適切なものはどれか。
(2016年 大分県公立入試 類似)
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1. 各観測地点を中心とし、そこから震央までの距離を半径とする円を描き、それらの円の交点を求める。 | 2. 各観測地点を中心とし、そこから震央までの距離を直径とする円を描き、それらの円が接する点を求める。 | 3. 各観測地点を中心とし、初期微動の最大振幅を半径とする円を描き、それらの円が重なる面積の中心を求める。 | 4. 二つの観測地点を結ぶ直線を一辺とする正三角形を描き、その重心を震央とする。 |
|---|---|---|--|
- 問5 湖の底に長い年月をかけて形成された、薄い層が幾重にも重なる縞模様の堆積物の中に、火山灰の層が含まれていることがあります。この火山灰の層が、離れた地域の地層を対比する際に非常に有効である理由として、最も適切なものはどれですか。
(2019年 福岡県公立入試 類似)
- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. 流水の働きによって粒の大きさごとに選別され、特定の場所にのみ集まるから。 | 2. 一度の噴火によって広範囲にわたって、きわめて短期間のうちに降り積もるから。 | 3. 特定の狭い範囲にのみ堆積し、当時の湖の環境を限定的に示す性質があるから。 | 4. 数万年という長い年月をかけてゆっくりと降り積もり、厚い層を形成するから。 |
|---|--|---|---|
- 問6 流水や風のはたらきによって、岩石や地層が表面から削り取られる現象を何というか、最も適切な名称を選択してください。
(2018年 佐賀県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. 堆積 | 2. 運搬 | 3. 侵食 | 4. 風化 |
|-------|-------|-------|-------|
- 問7 ある観測地点において、地震計による記録を確認したところ、P波の到着時刻は8時43分25秒であった。震源からこの地点までの距離が120kmであり、P波が120kmを伝播するのに20秒かかることが分かっているとき、この地震の地震発生時刻として正しいものはどれか。
(2014年 兵庫県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 8時42分45秒 | 2. 8時42分55秒 | 3. 8時43分15秒 | 4. 8時43分05秒 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
- 問8 気象庁が定めている、地震によるある地点での揺れの強さを表す「震度」の階級について、その構成を正しく説明したものはどれですか。
(2016年 愛知県公立入試 類似)
- | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1. 0から7までの8段階に分けられている。 | 2. 1から10までの10段階に分けられている。 | 3. 1から12までの12段階に分けられている。 | 4. 0から7までの階級があるが、5と6にはそれぞれ「弱」と「強」があり、全部で10段階に分けられている。 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
- 問9 地震が発生したとき、最初に届くP波による小さな揺れが始まってから、後から届くS波による大きな揺れが始まるまでの時間を何というか。
(2022年 佐賀県公立入試 類似)
- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1. 震央距離時間 | 2. 地震波到達時間差 | 3. 初期微動継続時間 | 4. 主要動継続時間 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
- 問10 地下の地層の様子を調査するためにボーリングなどを行い、特定の地点における地層の重なり方や、岩石の種類、層の厚さを垂直な柱のような形で表した図を何というか、名称を答えなさい。
(2017年 鹿児島県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------|----------|-----------|--------|
| 1. 柱状図 | 2. 地質断面図 | 3. 露頭スケッチ | 4. 地形図 |
|--------|----------|-----------|--------|
- 問11 火山の噴火によって噴き出された火山灰や軽石などの火山噴出物が、地表や水底に降り積もり、長い年月をかけて押し固められてできた岩石を何というか、最も適切な名称を選択してください。
(2023年 宮城県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1. 砂岩 | 2. 凝灰岩 | 3. れき岩 | 4. 玄武岩 |
|-------|--------|--------|--------|
- 問12 山頂付近の盛り上がりが小さく、山体の傾斜が非常に緩やかで左右に平たく広がった形状をしている火山について、その溶岩の性質と噴火の様子の組み合わせとして正しいものはどれですか。
(2020年 石川県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. 粘性が低い黒っぽい溶岩で、噴火の様子はおだやかである | 2. 粘性が高い白っぽい溶岩で、激しく爆発的な噴火をする | 3. 粘性が低い白っぽい溶岩で、噴火の様子はおだやかである | 4. 粘性が高い黒っぽい溶岩で、激しく爆発的な噴火をする |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
- 問13 震源からの距離と地震波の到着時刻の関係を調べたところ、P波の到着時刻とS波の到着時刻を結ぶそれぞれの線は、震源からの距離が大きくなるに従って、その間隔が一定の割合で広がっていくことがわかった。このとき、初期微動継続時間と震源からの距離の関係について説明したものとして、最も適切なものはどれか。
(2015年 長崎県公立入試 類似)
- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 初期微動継続時間は、震源からの距離に反比例する | 2. 初期微動継続時間は、震源からの距離に関わらず常に一定である | 3. 初期微動継続時間は、震源からの距離の2乗に比例する | 4. 初期微動継続時間は、震源からの距離にほぼ比例する |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|