

- 問1 生物の形質を決定する情報の担い手であり、「遺伝子の本体」である物質の名称として最も適切なものはどれか。 (2014年 佐賀県公立入試 類似)
1. DNA (デオキシリボ核酸)                      2. RNA (リボ核酸)                      3. アミノ酸                      4. タンパク質
- 問2 遺伝子型がAaである子の代のエンドウを自家受粉させ、孫の代の個体を得る実験を行う。孫の代における「顕性形質が現れる個体」と「潜性形質が現れる個体」の数の比（分離比）は、理論上どのようになると考えられるか。 (2017年 大分県公立入試 類似)
1. 顕性形質：潜性形質 = 3：1                      2. 顕性形質：潜性形質 = 2：1                      3. 顕性形質：潜性形質 = 1：2：1                      4. 顕性形質：潜性形質 = 1：1
- 問3 ジャガイモの塊茎（いも）やオランダイチョゴのほふく茎のように、植物の根・茎・葉といった体の一部から新しい個体をつくる無性生殖を特に何といいますか。 (2020年 石川県公立入試 類似)
1. 栄養生殖                      2. 孢子による生殖                      3. 出芽                      4. 分裂
- 問4 土壌中の微生物（分解者）の活動による物質の変化について、正しい説明はどれですか。 (2020年 愛知県公立入試 類似)
1. 有機物を無機物に分解し、二酸化炭素を放出する。                      2. 二酸化炭素を取り込み、有機物を蓄積する。                      3. 無機物から有機物を合成し、酸素を放出する。                      4. 他の生物を食べることで、有機物をそのまま体内に取り込む。
- 問5 タマネギの根の先端付近を切り取り、数分間温めたうすい塩酸に浸す操作を行う目的として、最も適切なものを答えなさい。 (2023年 宮城県公立入試 類似)
1. 不要なタンパク質を分解し、細胞の透明度を上げて観察しやすくするため                      2. 細胞の生命活動を止め、染色体を特定の色に染めやすくするため                      3. 細胞壁を完全に取り除き、細胞膜の中にある核を取り出すため                      4. 細胞同士の結びつきを弱め、細胞を1つずつ離れやすくするため
- 問6 玉ネギの根の先端部分で見られる体細胞分裂において、分裂によって新しくできた2つの細胞に含まれる染色体の数は、分裂前の細胞と比較してどのようになりますか。その理由とともに正しい説明を選びなさい。 (2021年 福岡県公立入試 類似)
1. 分裂前の半分の数になる。1つの細胞にある染色体が、分裂によって2つの細胞にそのまま分配されるため。                      2. 分裂前の2倍の数になる。細胞が2つに分かれる際に、それぞれの細胞内で染色体が新しく合成されるため。                      3. 分裂前と同じ数になる。分裂が始まる前に染色体が複製され、それが2つの細胞に均等に分かれるため。                      4. 分裂前と同じ数になる。分裂が終わった直後に、周囲の細胞から不足した染色体が補給されるため。
- 問7 デンプン溶液を混ぜて作った寒天培地を2つ用意し、一方には採取したばかりの土をのせ、もう一方には十分に加熱して殺菌した土をのせました。5日間放置した後、それぞれの培地にヨウ素液を滴下した際の反応として正しいものはどれですか。 (2021年 佐賀県公立入試 類似)
1. どちらの培地もデンプンが残っているため、ヨウ素液によって青紫色に変化する。                      2. 採取したばかりの土をのせた培地は青紫色に変化し、加熱した土をのせた培地は変化しない。                      3. どちらの培地もデンプンが完全に消失しているため、ヨウ素液に反応しなくなる。                      4. 採取したばかりの土をのせた培地は青紫色に変化せず、加熱した土をのせた培地は青紫色に変化する。
- 問8 エンドウの種子の形には「丸形」と「しわ形」という対立形質がある。丸形の純系としわ形の純系を親としてかけ合わせたとき、子の代ではすべて丸形の種子が得られた。この実験結果から導き出される、子の代に現れた形質に関する説明として最も適切なものはどれか。 (2024年 静岡県公立入試 類似)
1. 子の代に現れる形質は、受粉させる際の花粉の量によって決定される。                      2. 対立形質をもつ純系をかけ合わせた場合、子には両方の形質が混ざり合った中間的な形質が現れる。                      3. 子の代で現れなかったしわ形の形質は、遺伝子そのものが消失している。                      4. 対立形質をもつ純系をかけ合わせた場合、子にはどちらか一方の形質のみが現れる。
- 問9 クジラのひれとヒトの腕を比較すると、骨の配置や構造に多くの共通点が見られます。このように、現在は形やはたらきが異なっている、もとは同じ器官であったと考えられ、共通の祖先から変化した器官を何といいますか。 (2024年 福井県公立入試 類似)
1. 相同器官                      2. 相似器官                      3. 感覚器官                      4. 消化器官
- 問10 生物の生殖において、対になっている遺伝子が減数分裂の際に分かれて、別々の生殖細胞に入るという決まりを何といいますか。 (2025年 愛知県公立入試 類似)
1. 分離の法則                      2. 保存の法則                      3. 独立の法則                      4. 優性の法則
- 問11 生物が子をつくる際、減数分裂によって対になっている遺伝子がそれぞれ別々の生殖細胞に入ることを何の法則といいますか。正しい名称を答えなさい。 (2023年 神奈川県公立入試 類似)
1. 分離の法則                      2. 不完全優性の法則                      3. 優性の法則                      4. 独立の法則
- 問12 植物の根の先端付近にあり、新しい細胞を作るための細胞分裂がさかに行われている部分を何といいますか。 (2016年 大阪府公立入試 類似)
1. 根冠                      2. 道管                      3. 成長点                      4. 根毛
- 問13 ミカヅキモなどの単細胞生物に見られる、一つの親細胞が中央でくびれるようにして二つの独立した新しい個体に分かれるふえ方を何といいますか。 (2024年 青森県公立入試 類似)
1. 栄養生殖                      2. 出芽                      3. 分裂                      4. 受粉
- 問14 体細胞分裂が進行する過程において、細胞内で観察される現象を時間の経過に沿って正しく並べたものはどれですか。 (2025年 高知県公立入試 類似)
1. 染色体が細胞の中央に並ぶ → 核の中にひも状の染色体が現れる → 染色体が分かれて両端に移動する → 細胞の中央に仕切りができ、核が2つ形成される                      2. 細胞の中央に仕切りができ、核が2つ形成される → 核の中にひも状の染色体が現れる → 染色体が細胞の中央に並ぶ → 染色体が分かれて両端に移動する                      3. 核の中にひも状の染色体が現れる → 染色体が細胞の中央に並ぶ → 染色体が分かれて両端に移動する → 細胞の中央に仕切りができ、核が2つ形成される                      4. 核の中にひも状の染色体が現れる → 染色体が分かれて両端に移動する → 染色体が細胞の中央に並ぶ → 細胞の中央に仕切りができ、核が2つ形成される