

- 問1 両生類と、二ホンヤモリなどのは虫類を比較したとき、は虫類が乾燥した陸上環境で活動するのに有利な特徴を説明したものとして、最も適切なものはどれですか。 (2025年 山口県公立入試 類似)

1. からだの表面が常に湿っているため、皮膚呼吸によって大量の酸素を吸収することができる。

2. からだの表面を粘液で包んでいるため、直射日光による体温の上昇を抑えることができる。

3. からだの表面がうろこで覆われているため、体内から失われる水分を最小限に抑えることができる。

4. からだの表面に厚い脂肪の層があるため、周囲の温度変化に関わらず体温を一定に保つことができる。
- 問2 被子植物において、柱頭についた花粉から花粉管がのび、めしべの脂肪の中にある胚珠に到達した後、精細胞の核と卵細胞の核が合体する現象を何というか。 (2016年 山梨県公立入試 類似)

1. 受粉

2. 蒸散

3. 受精

4. 発生
- 問3 無性生殖の仕組みについて述べたものとして、共通する原理に基づいた説明はどれですか。 (2024年 埼玉県公立入試 類似)

1. 必ず2つの個体に関わることで、多様な遺伝子の組み合わせを持つ子が生まれる

2. 花の受粉によって種子がつくられ、その種子が芽を出すことで新しい個体となる

3. 精子や卵といった特別な生殖細胞がつくられず、受精なしに新しい個体が生じる

4. 親の体の一部から芽が出るようにふえるが、必ず減数分裂を経てから個体となる
- 問4 バンノウの生殖を顕微鏡で観察したところ、卵に精子が入り、それぞれの核が合体する様子が見られました。このとき、合体して一つになった細胞（受精卵）が、もとの卵や精子と比較して「新しい個体をつくるための出発点」と言える理由は、どのような現象が起きているためですか。 (2019年 山口県公立入試 類似)

1. 海水の塩分濃度によって、卵の細胞膜が厚くなり保護されるため

2. 精子が卵の周りに集まることで、卵の大きさが変化して成長しやすくなるため

3. 分裂を繰り返さずに、そのまま親と同じ大きさの個体に成長するため

4. 雌の卵と雄の精子が合体することで、次世代に必要な情報が揃った一つの細胞になるため
- 問5 タマネギの根の先端付近（成長点を含む部分）と、そこから少し離れた部分のそれぞれについて、うすい塩酸と酢酸カーミン液（または酢酸オルセイン液）の混合液に浸した後にスライドガラスにのせ、カバーガラスを被せて指で押しつぶしました。このとき、うすい塩酸を用いたことによって得られる観察上の利点は何ですか。 (2025年 福岡県公立入試 類似)

1. 根の先端付近にある分裂が盛んな細胞のみを特異的に染色できること

2. 細胞膜の透過性を高め、染色液が核の内部まで速やかに浸透すること

3. 押しつぶした際に細胞がバラバラになり、細胞が重なるのを防げることに

4. 細胞の大きさを数倍に膨張させ、顕微鏡の低倍率でも観察可能にすること
- 問6 受精卵が細胞分裂を開始してから、胞胚（ほうはい）になるまでの期間における「胚全体の大きさ」と「細胞1つあたりの大きさ」の変化について説明したものとして、最も適切なものはどれか。 (2024年 和歌山県公立入試 類似)

1. 胚全体の大きさは次第に大きくなっていき、細胞1つあたりの大きさは変わらない。

2. 胚全体の大きさは次第に大きくなっていき、細胞1つあたりの大きさも大きくなっていく。

3. 胚全体の大きさは受精卵とほぼ変わらず、細胞1つあたりの大きさは小さくなっていく。

4. 胚全体の大きさは受精卵とほぼ変わらず、細胞1つあたりの大きさも変わらない。
- 問7 親の細胞内には、大きさや形の同じ染色体が対になって存在しています。生殖細胞がつくられる過程で、これら対になった染色体が分かれて別々の細胞に入るという遺伝の法則を何といいますか。 (2020年 岩手県公立入試 類似)

1. 独立の法則

2. 連鎖の法則

3. 優性の法則

4. 分離の法則
- 問8 マツバボタンを用いた遺伝の観察において、親の体細胞が持つ対の遺伝子が分かれて、それぞれ別々の生殖細胞に入る現象がみられます。この現象の背景にある細胞分裂の特徴として正しいものはどれですか。 (2019年 千葉県公立入試 類似)

1. 受精卵がつくられた直後に、染色体の数が半分に減少している

2. 染色体の数が半になる減数分裂が行われている

3. 染色体の数が2倍になる減数分裂が行われている

4. 染色体の数が変わらない体細胞分裂が行われている
- 問9 丸い種子（顕性）としわのある種子（潜性）を作るエンドウを用いて、丸い種子の遺伝子構成を調べる実験を行います。遺伝子構成がヘテロ接合である丸い種子の個体に、潜性形質である「しわ」の個体を掛け合わせたとき、生まれてくる子の形質の分離比（丸：しわ）はどのようになりますか。 (2023年 徳島県公立入試 類似)

1. 1：0（すべて丸）

2. 3：1

3. 1：1

4. 1：2：1
- 問10 生物が子孫を残す際、精子や卵などの生殖細胞をつくるために行われる、染色体の数がもとの細胞の半になる特別な細胞分裂を何といいますか。 (2023年 福井県公立入試 類似)

1. 出芽

2. 受精

3. 体細胞分裂

4. 減数分裂
- 問11 ある森においてウサギとキツネの個体数変化を長期間調査したところ、ウサギの数が増加してピークを迎えると、少し遅れてキツネの数も増加し、その後ウサギの数が減少に転じると、再び遅れてキツネの数も減少するという周期的な変動が確認されました。このような観察結果から推測される現象の説明として、最も適切なものはどれですか。 (2017年 福井県公立入試 類似)

1. キツネの数が増えるとウサギの餌となる植物が急激に増えるため、結果としてウサギの数は常にキツネより先に減少する。

2. 捕食者であるキツネが増えると、被食者であるウサギが食べられる量が増えて減少するが、ウサギが減るとキツネも食料不足となって減少する。

3. ウサギの個体数が減少するのは、常に病気の流行や大規模な気候変動など、外部環境の変化のみが原因である。

4. ウサギとキツネは互いに影響を与えることはなく、それぞれが独立して個体数を増減させている。
- 問12 生物が成長する際などに行われる細胞分裂において、核の中にある染色体はどのような過程を経て新しい細胞へと受け継がれますか。最も適切な説明を選びなさい。 (2024年 熊本県公立入試 類似)

1. 染色体があらかじめ複製され、それが2つに分かれて細胞の両端へと移動する

2. 染色体が消失した後、細胞の中央にできる細胞板から新しい染色体が作られる

3. 染色体が細胞の中央に集まり、互いに合体して巨大な核を形成する

4. 染色体は複製されずに、ランダムな数ずつ新しい細胞へと分配される
- 問13 下水処理場において、水の汚れである有機物を分解するために利用されている微生物のうち、鐘（かね）のような形をした単細胞の原生動物を何といいますか。 (2022年 長野県公立入試 類似)

1. ツリガネムシ

2. ミカヅキモ

3. アメーバ

4. ハネケイソウ